

A operação de Phelps foi praticada em ambos os pés e em consequencia della causou admiração o modo por que foi obtido o indireitamento. Apenas foi preciso um curto tratamento orthopedico para consolidar o resultado.

Ja dissemos bastante, cremos, para demonstrar ao mesmo tempo a benignidade e a efficacia da operação de Phelps.

Graças a ella acerta-se rapidamente o fim estheticico e sem riscos nos casos em que o indireitamento era já impossivel ou pelo menos necessitava um tratamento orthopedico longo e difficil, cujos resultados definitivos eram aleatorios.

Graças a ella ainda as differentes operações dos ossos, tarso-tomia, tarsectomia, astragalotomia, etc., não serão mais do que processos excepcionaes, applicaveis somente a deformidades extremamente pronunciadas, ou, como no adulto, a pés-tortos inveterados. (*Bulletin Médical*).

MOLESTIA DE THOMSEN — Esta affecção, descripta, pela primeira vez, em 1876, pelo Dr. Thomsen de Kappeln, e de que vieram depois a soffrer elle proprio e varios membros de sua familia, acaba de ser tambem observada na Suecia pelo Dr. Wising, constituindo este caso o trigesimo terceiro até agora conhecido na sciencia.

Ao envez do que se déra com a familia Thomsen e os casos de Pontoppidan e Bernhardt, nenhuma influencia hereditaria se fazia sentir n'este doente, um estudante de Stockholmo, de 18 annós, em cuja familia jamais foram observados symptomas de myotomia nem de qualquer affecção neuro ou psychopathica.

No paciente de Wising a molestia de Thomsen, cujo symptoma essencial consiste na continuação da contracção dos musculos depois de haver cessado a intenção de movel-os, estado a que Seeligmüller denominou «Intentions-krampf», tinha determinado as manifestações myotonicas em quasi todos os musculos do corpo, especialmente nos das extremi-

dades, da garganta e da face, tornando-se ainda mais salientes no abrir dos olhos.

Eram também affectados os musculos da lingua e da mastigação e isentos os do pharynge e dos olhos.

O bom humor, um copo de vinho ou uma temperatura moderada abrandavam a affecção, que se exacerbava, ao contrario pelo tempo muito quente e oppressivo.

A hypertrophia muscular, symptoma também proeminente da myotomia, como Seeligmüller primeiro o mencionou, era muito pronunciada em todos os musculos, especialmente nos deltoides os femoraes e os gastrocnemeos.

O Dr. Wising considera a affecção como de character permanente, mas sem influencia alguma sobre a duração da vida, e julga de vantagem os exercicios gymnasticos já aconselhados por Thomsen.

PROPHYLAXIA DA TUBERCULOSE. — Dez mil exemplares das prescrições cuja substancia damos em seguida, formuladas pelo «New-York Board of Health», acabam de ser profusamente distribuidos pela União Americana, com o fim de prevenir o contagio das affecções tuberculosas.

1.º Os escarros suspeitos devem ser recebidos em vasos de barro ou de vidro contendo uma solução de bichlorêto de mercurio, 1 para 1.000.

2.º Não dormir em quarto occupado por pessoa que se suspeite soffrer de consumpção. Os aposentos habitados por um tísico devem ser o menos mobiliados que for possível. O uso de tapeçarias, etc., deve sempre ser completamente abandonado.

3.º Não deixar de lavar perfeitamente com agua fervendo, logo depois de servido os utensilios de meza de toda pessoa suspeita de consumpção.

4.º Não misturar a sopa servida dos tísicos com a de outras pessoas.

5.º Não prescindir de receber as dejecções diarrheicas d'estes