

dades, da garganta e da face, tornando-se ainda mais salientes no abrir dos olhos.

Eram também affectados os musculos da lingua e da mastigação e isentos os do pharynge e dos olhos.

O bom humor, um copo de vinho ou uma temperatura moderada abrandavam a affecção, que se exacerbava, ao contrario pelo tempo muito quente e oppressivo.

A hypertrophia muscular, symptoma também proeminente da myotomia, como Seeligmüller primeiro o mencionou, era muito pronunciada em todos os musculos, especialmente nos deltoides os femoraes e os gastrocnemeos.

O Dr. Wising considera a affecção como de character permanente, mas sem influencia alguma sobre a duração da vida, e julga de vantagem os exercicios gymnasticos já aconselhados por Thomsen.

PROPHYLAXIA DA TUBERCULOSE. — Dez mil exemplares das prescrições cuja substancia damos em seguida, formuladas pelo «New-York Board of Health», acabam de ser profusamente distribuidos pela União Americana, com o fim de prevenir o contagio das affecções tuberculosas.

1.º Os escarros suspeitos devem ser recebidos em vasos de barro ou de vidro contendo uma solução de bichlorêto de mercurio, 1 para 1.000.

2.º Não dormir em quarto occupado por pessoa que se suspeite soffrer de consumpção. Os aposentos habitados por um tísico devem ser o menos mobiliados que for possível. O uso de tapeçarias, etc., deve sempre ser completamente abandonado.

3.º Não deixar de lavar perfeitamente com agua fervendo, logo depois de servido os utensilios de meza de toda pessoa suspeita de consumpção.

4.º Não misturar a sopa servida dos tísicos com a de outras pessoas.

5.º Não prescindir de receber as dejecções diarrheicas d'estes

pacientes n'um vaso contendo sublimado corrosivo (uma parte) e agua (mil partes).

6.º Não deixar a familia de consultar o medico a respeito das relações sociaes de pessoas que se desconfia soffrerem de consumpção.

7.º Não consentir que as mães suppostas affectadas de consumpção amamentem sua prole.

8.º As aves ou os animaes domesticos são muito susceptiveis de adquirir a tuberculose, pelo que se não deve expol-os ao contacto de pessoas tisticas; egualmente, não conservar, porem destruir immediatamente, todos os já suppostos de consumpção, pois d'outra sorte elles podem transmittil-a\* a seres humanos.

9.º Acciar perfeitamente os soalhos, as paredes e os forros das salas e dos quartos dos individuos que soffrem de consumpção, pelo menos uma vez em duas semanas.

**MOLESTIA DE MORVAN.** — Um novo caso de panaricio analgesico observado pelo Dr. Thiriar, de Bruxellas, parece vir em apoio da doutrina que admite uma lesão do systema nervoso central n'essa molestia.

No unico exame post-mortem praticado até agora, em um doente do proprio Dr. Morvan (*Gazette des Hopitaux*, 30 de Abril de 1889), encontraram-se ambas as lesões nervosas, peripherica e central, estando affectados os nervos das extremidades superiores e da ampliação cervical da medulla.

Nos nervos havia uma hyperplasia do tecido connectivo e na medulla um desenvolvimento anormal do tecido intersticial, occupando as columnas e os cornos posteriores e, provavelmente, a substancia cinzenta central.

Infelizmente não foi possivel determinar si existiam cavidades morbidas tubulares perto das porções centraes da medulla, — a forma de lesão intitulada syringo-myelia —, que o Dr. Thiriar acredita ser a condição a que é devido o panaricio analgesico.

Sua doente era uma mulher de sessentã e seis annos, que