

pacientes n'um vaso contendo sublimado corrosivo (uma parte) e agua (mil partes).

6.º Não deixar a familia de consultar o medico a respeito das relações sociaes de pessoas que se desconfia soffrerem de consumpção.

7.º Não consentir que as mães suppostas affectadas de consumpção amamentem sua prole.

8.º As aves ou os animaes domesticos são muito susceptiveis de adquirir a tuberculose, pelo que se não deve expol-os ao contacto de pessoas tisticas; egualmente, não conservar, porem destruir immediatamente, todos os já suppostos de consumpção, pois d'outra sorte elles podem transmittil-a* a seres humanos.

9.º Acciar perfeitamente os soalhos, as paredes e os forros das salas e dos quartos dos individuos que soffrem de consumpção, pelo menos uma vez em duas semanas.

MOLESTIA DE MORVAN. — Um novo caso de panaricio analgesico observado pelo Dr. Thiriar, de Bruxellas, parece vir em apoio da doutrina que admite uma lesão do systema nervoso central n'essa molestia.

No unico exame post-mortem praticado até agora, em um doente do proprio Dr. Morvan (*Gazette des Hopitaux*, 30 de Abril de 1889), encontraram-se ambas as lesões nervosas, peripherica e central, estando affectados os nervos das extremidades superiores e da ampliação cervical da medulla.

Nos nervos havia uma hyperplasia do tecido connectivo e na medulla um desenvolvimento anormal do tecido intersticial, occupando as columnas e os cornos posteriores e, provavelmente, a substancia cinzenta central.

Infelizmente não foi possivel determinar si existiam cavidades morbidas tubulares perto das porções centraes da medulla, — a forma de lesão intitulada syringo-myelia —, que o Dr. Thiriar acredita ser a condição a que é devido o panaricio analgesico.

Sua doente era uma mulher de sessentã e seis annos, que

soffrera, seis annos antes, uma contusão no pollegar esquerdo, a qual provocou uma tumefacção muito grande, que nunca desapareceu inteiramente.

Quatorze mezes antes de sua admissão, as duas primeiras phalanges do dedo annular da mão direita se tornaram tumefeitas e dolorosas, abrindo-se ultimamente e dando sahida a algum pús.

Um anno mais tarde, o pollex esquerdo tornou-se de novo doloroso e augmentado de volume, e algum tempo depois rompeo-se evacuando-se um pouco de pús. Desde aquelle tempo havia sido muito pequena a dor de cada um dos panaricios.

Pelo exame, encontraram-se inflammadas as glandulas lymphaticas de ambos os lados do pescoço e em ambas as axillas, e os braços em sua parte superior estavam ambos consideravelmente atrophiados e carecendo de sensibilidade.

Não havia dor nem dormencia na visinhança de cada um dos panaricios.

A theoria proposta pelo Dr. Thiriar para dar a razão do segundo panaricio, que sobreveio sem causa alguma apparente, é que o mal antigo do pollegar esquerdo, que jamais fora curado, originou uma nevrite ascendente que foi seguida de syringo-myelia e então, provavelmente de nevrite descendente no lado direito.

MEIO DE ALLIVIO PARA O ESPASMO DA TOSSE CONVULSA. — Heiberg fora o primeiro a observar que o levantamento da maxilla superior é o melhor methodo para fazer o larynge admittir ar, e recommendou um processo para este fim, o qual fôra antes d'elle mencionado por Kappeler, e que o Dr. Nægeli modificou e descreveo da maneira seguinte:

Considerando-se em frente da creança, a ama se apodera fortemente, com o dedo indicador e o medio, do ramo ascendente do maxilar inferior em frente do ouvido, colloca ambos os pollegares contra o mento, e por meio de uma tracção e