

soffrera, seis annos antes, uma contusão no pollegar esquerdo, a qual provocou uma tumefacção muito grande, que nunca desapareceu inteiramente.

Quatorze mezes antes de sua admissão, as duas primeiras phalanges do dedo annular da mão direita se tornaram tumefeitas e dolorosas, abrindo-se ultimamente e dando sahida a algum pús.

Um anno mais tarde, o pollex esquerdo tornou-se de novo doloroso e augmentado de volume, e algum tempo depois rompeo-se evacuando-se um pouco de pús. Desde aquelle tempo havia sido muito pequena a dor de cada um dos panaricios.

Pelo exame, encontraram-se inflammadas as glandulas lymphaticas de ambos os lados do pescoço e em ambas as axillas, e os braços em sua parte superior estavam ambos consideravelmente atrophiados e carecendo de sensibilidade.

Não havia dor nem dormencia na visinhança de cada um dos panaricios.

A theoria proposta pelo Dr. Thiriar para dar a razão do segundo panaricio, que sobreveio sem causa alguma apparente, é que o mal antigo do pollegar esquerdo, que jamais fora curado, originou uma nevrite ascendente que foi seguida de syringo-myelia e então, provavelmente de nevrite descendente no lado direito.

MEIO DE ALLIVIO PARA O ESPASMO DA TOSSE CONVULSA. — Heiberg fora o primeiro a observar que o levantamento da maxilla superior é o melhor methodo para fazer o larynge admittir ar, e recommendou um processo para este fim, o qual fôra antes d'elle mencionado por Kappeler, e que o Dr. Nægeli modificou e descreveo da maneira seguinte:

Considerando-se em frente da creança, a ama se apodera fortemente, com o dedo indicador e o medio, do ramo ascendente do maxilar inferior em frente do ouvido, colloca ambos os pollegares contra o mento, e por meio de uma tracção e

pressão vigorosa mas delicada, move a maxilla inferior para diante e para baixo.

Si a boca estiver um pouco aberta, o maxillar pode ser fixado pela collocação do pollegar ou do indicador unicamente atraz dos incisivos anteriores e inferiores e agarrando o mento com o resto da mão, e executando a tracção como acima.

Em todos estes casos, a mão esquerda conserva-se na testa do paciente e exerce a tracção em sentido contrario.

Si a ama estiver atraz do paciente, pode collocar ambos os pollegares acima do angulo maxillar, o index na arcada zygomática e o resto dos dedos no mento, empurrando para diante e para baixo. Immediatamente a maxilla superior é levantada e a creança deve ser sollicitada a tomar uma respiração profunda.

O plano pode ser adoptado ainda que o acesso venha durante o somno, e Nægeli affirma que n'esse caso a creança não desperta. (*The Lancet* — Agosto de 1889).

METEOROLOGIA

Observações meteorologicas do mez de setembro

PELO CONS. DR. ROSENDO A. P. GUIMARÃES

A temperatura média do mez foi 25°,27; no mesmo mez do anno passado 25°,46. A temperatura ao sol, na média, 36°,33; no mez do anno passado 37°,50. A temperatura maxima 27°,50; no mez do anno passado 27°,50. A minima 22°; no mez do anno passado 23°. A média maxima dos dias 26,11; no mez do anno passado 26°,36. A média minima das noites 24°,04; no mez do anno passado 24°,33.

A pressão barometrica média, observada no barometro, 762^{mm},33, e calculada a zero 759^{mm},26; no mez do anno passado foi esta 757^{mm},74. Pressão maxima 764^{mm},00; minima 759^{mm},00 (absolutas).