

## NEVRO-PATHOLOGIA

**Ligeiras considerações a proposito  
de um caso de hematidrose  
hysterica**

PELO DR. ALFREDO BRITTO (1)

Foi-me dado, em começo d'este anno, observar, na villa de Itaparica, onde então me achava, um interessante caso, cuja historia julgo de vantagem publicar, por tratar-se de uma rara curiosidade pathologica, por muito tempo contestada, até pelos proprios auctores do « Compendium de Medicina », porém brilhantemente demonstrada em a notavel memoria de Parrot, e conhecida pelos nomes de *hematidrose*, *hematopedese*, *ephidrosis cruenta*, *suor de sangue* (*bloody sweat* dos inglezes e *Schweiss Bluter* dos allemães).

Tratava-se de uma meniça de 10 para 11 annos, de côr parda, constituição debil e temperamento lymphatico, tendo soffrido, desde a mais tenra idade, frequentes accessos de asthma, contra os quaes varias medicações haviam sido por vezes empregadas sem o minimo proveito. Desolada a mãe d'essa creança com a pertinacia d'este soffrimento, unico que até então a affligia, não duvidou recorrer ao uso de uma droga que lhe foi, a seu pedido, ministrada por um celebre domador de cobras que, em excursões por differentes localidades da provincia, preconisava e vendia não só o seu famoso antidoto contra o veneno ophidico, mas ainda alguns especificos para differentes molestias.

No oitavo e ultimo dia do uso do tal preparado, que fôra, conforme a prescripção, quotidianamente propinado na dose de dez gottas pela manhã e outras tantas á tarde, apercebeu-se a mãe da menina de que, estando esta a dormir, corria-lhe pela commissura labial, em quantidade não pequena, um liquido que pelo aspecto se lhe affigurou sangue. Fazendo despertar a doente e abrir a bocca, poude ella verificar que através de toda

(1) Communicação feita á Sociedade Medica da Bahia.

a mucosa buccal manava o referido liquido, o que ainda perdurou algum tempo, cessando mais tarde espontaneamente, para recommençar no dia seguinte, não já como simples stomatorrhagia, mas\*acompanhando-se tambem de epistaxis.

Assustada, corre em busca do curandeiro, o qual se havia já ausentado da villa, sem que se soubesse para onde. Como, porém, nos dias subsequentes o facto se não reproduzisse e nenhum accesso astmatico houvesse reaparecido ou ameaçado, desde a primeira applicação da tal substancia, conseguiu ella tranquillisar-se, considerando certa a cura da nevrose dos bronchios (a qual effectivamente se mantinha até Abril quando a perdi de vista) e explicando aquelles accidentes como prova da efficacia ou *força do remedio*, em sua propria expressão, e sem consequencias ulteriores.

Para logo, entretanto, volveram-lhe as apprehensões, observando as modificações que no character e no moral de sua filha, dia a dia se iam operando. Anteriormente alegre e descuidosa como as de sua idade, ia-se a pouco e pouco a menina tornando irritavel e taciturna, furtando-se aos brincos e folguedos de suas companheiras, para encerrar-se longas horas em obstinado mutismo, do qual passava,\* em rapida transição e pelo mais frivolo motivo, para verdadeiros accessos de riso louco e gargalhadas interminaveis ou perigosas explosões de raiva, em que despedaçava quanto se lhe achava proximo.

\* Isto não obstante, desenvolvia-se-lhe particular tendencia para os adornos e esmerada elegancia no vestuario, ao que se juntava um certo ar de garridice, que não quadravam com a sua idade, habitos, educação e, ainda menos, com o atraso de seu desenvolvimento. Vezes succedia, em se achando a sós, escapar-se de casa, victima de um verdadeiro automatismo ambulatorio, para vagar inconsciente pelas ruas e praias, onde acabavam por encontral-a, depois de angustias sem conta. E assim foram-se incrementando estas desordens psychonervosas, até que em breve explodiram ataques convulsivos, nos quaes, no dizer naturalmente hyperbolico da familia,

chegava a menina a subir pelas paredes, o que logo despertava a idéa de possessão.

Foi em seguida a um d'esses ataques, ao qual sobreveio perda de conhecimento, que pela primeira vez observou-se o phenomeno que passo a descrever e faz o principal objecto d'esta observação. Atravéz de todo o tegumento externo da doente porejava um liquido roseo ou vermelho, mais ou menos vivo, cujas gottas aljofrando a principio toda a superficie cutanea, como se foram bagas de suor corado, se iam gradualmente avolumando, e acabavam por fundir-se em longos fios que se deslisavam pelas regiões declives. Em maior ou menor extensão e abundancia, durava essa transudação de dez minutos até meia hora, chegando ás vezes a innundar-lhe completamente as vestes e o pavimento subjacente. No couro cabelludo, o liquido sempre mais copioso apresentava aspecto differente: muito menos fluido, de consistencia viscosa e côr branco-acinzentada ou amarellada, elle francamente se assemelhava ao pus, e a familia certissima estava que o era. Se não houvesse o cuidado de lavar immediatamente os cabellos, estes logo se agglutinavam por modo a tornar difficilimo todo o accio ulterior, e entravam, dentro em pouco, a exhalar um cheiro fortemente nauseabundo.

Quando travei conhecimento com esta doente, de quem aliás havia já tido noticia, pois o facto se divulgára causando certa sensação e motivando commentarios de toda ordem, os ataques convulsivos haviam quasi desaparecido, apresentando-se apenas de longé em longé e com intensidade muito menor. Substituiam-n'os, porém, os accessos de hematidrose, que se repetiam a pequenos intervallos, em dias consecutivos por veses, precedidos apenas por aggravação da cephalalgia habitual, sensação de bolo esophagiano, forte displicencia e um sentimento oppressivo de angustia geral que precedia immediatamente a perda de conhecimento, com que se acompanhava quasi sempre o accésso, especialmente quando era de hematidrose geral. Tinham-se tornado tambem muito mais fre-

quentes ultimamente os accessos de hematidrose parcial ou local, occupando de preferencia toda a extremidade cephalica, unicos que tive occasião de observar.

A primeira vez que o consegui, cessára momentos antes da minha chegada a hemorragia, que não fôra então muito abundante; acabava a menina de voltar a si, alquebrada ainda pela fadiga, embora pouco duradoura, em que a deixavam esses accessos, e tenho por impossivel jamais se me possa apagar a profunda e singular impressão que me causou a physionomia da doente, cujo semblante se achava coberto de uma espessa camada de um vermelho escuro ou carregado, verdadeira mascara de sangue coagulado, onde scintillavam, como carbunculos, os olhos muito negros a contrastar sinistra-mente com o esbraziado das faces.

Ainda hoje lamento não me haver sido possivel, pela carencia absoluta dos apparelhos e reagentes indispensaveis, fazer o reconhecimento analytico da natureza hematica do liquido transudado, por qualquer dos processos ordinarios, microscopico, spectroscopico ou chimico. Mau grado, porém, essa lacuna involuntaria, de nenhum outro liquido organico parece-me se possa suspeitar, porquanto só poderia a crosta a que me referi e observei ser constituida pelo *crur* e os elementos solidos do *liquor* sanguineo, rapidamente se evaporando, a medida que se ia lentamente exhalando, a porção aquosa respectiva do plasma. E o character especial já mencionado que tinha o liquido vertido atravéz o couro cabelludo, julgo rasoavelmente explicavel pelo facto de predominar n'essa região o processo da diapedese ao da effracção capillar, dando provavelmente logar á passagem ou migração de muito maior abundancia de leucocytos que de hemacias.

Uma ou outra vez, affirmou-me a familia e testemunharam varias pessoas, operava-se na fórma e natureza do accesso uma exquisita substituição, que, por muito singular, não devo omittir. Consistia elle, depois dos prodrômos habituaes dos accessos ordinarios de hematidrose, n'uma exsudação bastante

copiosa de um liquido, limpido como crystal de rocha, que borbotava da depressão umbilical, constituindo um notavel specimen, excepcional talvez, de tão abundante hyperhidrose ou hyperephidrose local.

Do exame a que procedi no intervallo dos accessos, pude colher os seguintes dados semeiologicos, dos quaes, por amor á concisão, vou esboçar apenas um succinto resumo. Descoramento pronunciado de toda a superficie tegumentar visivel, o que, de par com os sopros cardio-vasculares liquidos ou anorganicos, impunha logo o reconhecimento de uma anemia intensa; desenvolvimento um tanto anormal do tecido celluloadiposo, de consistencia muito flacida; notavel tympanismo abdominal, revelador da paresia intestinal, que se denunciava ainda pela constipação, lentidão das digestões e dysorexia habituaes; anesthesia e analgesia cutanea generalisadas, á excepção d'uma faixa longitudinal hyperesthesica em toda extensão do rachis, verdadeira espinalgia, e da região correspondente á junção do frontal e dos parietaes, séde habitual do *clavens*; myosalgias multiplas; ovaria dupla, de intensidade fraca; appallescencia completa; grande diminuição da sensibilidade thermica; enfraquecimento consideravel da força e do sentido muscular; estreitamento do campo visual, mais pronunciado á direita, bem como a dyschromatopsia e a menor acuidade da visão e paracusia, maior á esquerda. Apparelhos circulatorio, respiratorio e renal, reflexos tendinosos, gestação e olfacção, normaes.

Explorando a sensibilidade hypnotica, verifiquei que a doente caía em lethargia profunda, *sem hyper-excitabilidade neuro nem cutano-muscular*, no fim de dois a tres minutos de fixação do olhar, desacompanhada de qualquer suggestão voluntaria.

○ levantamento dos véos palpebraes, que se conseguia com esforço, tão intensa era sua oclusão spasmodica, ao em vez de fazel-a passar á catalepsia como na Salpêtrière, despertava-a, observando-se inteira abolição da memoria post-

hypnotica. Muito desenvolvida era sua suggestibilidade, quer em vigilia, quer em estado somnambulo, podendo-se obter com a maior facilidade desde a catalepsia suggestiva até a mais perfeita hallucinabilidade intra ou post-hypnotica, com amnesia completa, passando pelos differentes grãos de movimentos automaticos, rotatorios ou não, contracturas, illusões, etc.

Ante a nitidez e a precisão do syndroma exposto, no qual se vê um bello quadro dos signaes permanentes ou estigmas da hysteria, não é difficil affirmar que a doente em questão era effectivamente uma hystérica. E, se attendermos á modalidade de seus ataques, os quaes, pela descripção dos que presenciaram-n'os, se caracterisavam principalmente pela predominancia dos grandes movimentos e a violencia das convulsões, dos saltos e outros exercicios de acrobacia, tomando logar no sègundo grupo da «variedade por modificação do sègundo periodo dos quatro da grande hysteria classica», sègundo Charcot e Richer, affastando-se, portanto, dos ataques demoniacos para se identificarem com os de clownismo, sem custo se depreheende que deve ser ella classificada n'esta zona mixta ou intermediaria da nevrose hystérica, onde se immiscuem caracteres da hystero-epilepsia e da *hysteria minor* ou vulgar, sem que seja possivel referil-a exclusivamente a qualquer d'ellas.

Não trepidei tambem um instante em filiar a essa mesma nevropathia a manifestação dos suores de sangue, estatuindo o diagnostico de—hematidrose hystérica.

Que se tratava de uma hemorrhagia nevropathica, physiopathologicamente explicavel pela dilatação vaso-paralytica dos capillares e das arteriolas que irrigam as glandulas sudoriparas, cuja abundante vascularisação é notoria, e não da affecção conhecida sob a denominação de hemophilia ou diathese hemorrhagipara, demonstram-n'o á evidencia a ausencia verificada de hereditariedade, o facto de pertencer a doente ao sexo feminino, de não se acompanharem de hemorrhagias trauma-

ticas os pequenos ferimentos de que aliás era ella victima frequentemente, a apparição tardia das hemorragias, sua fórma particular, e comcumentancia com outras manifestações nervosas, a fraca repercussão sobre o estado geral, condições estas contrarias todas á hemorrhaphilia.

Que, por outro lado, exclusivamente á conta da hysteria, incontestavel na doente, se póde rasoavelmente lançar a responsabilidade de sua hematidrose, não restará certamente a menor duvida a quem reflectir sobre a varidade surprehendente de manifestações que no dominio da innervação vaso-motriz costuma essa nevrose produzir, desde as simples hyperhemias, placas erythematosas, erupções papulosas, vesiculosas, urticariformes e pemphygoides ou queimaduras espontaneas, que tanta admiração causam, até as infiltrações sorosas, verdadeiros edemas hystericos e as hemorragias subcutaneas, ecchymoses e manchas purpureas, estigmas que deixa a colera no corpo das pessoas nervosas por onde passa, ou mucosas, especialmente hemoptyses e hematemeses.

E si, por ventura, ainda no vasto scenario da hysteria, quizer-se uma analogia mais estreita ou identidade mesmo com as hematidroses, facil é encontral-a nas lagrimas de sangue, cruces e corôas de espinhos das celebres personagens, cuja historia cuidadosamente registram os fastos da medicina e da theurgia, tendo como um de seos mais notaveis especimens o da famosa estigmatisada belga Luiza Lateau, facto que teve tambem entre nós um seo congenere, não ha muitos annos desaparecido, e cuja descripção minuciosa, promettida pelo Sr. Dr. Silva que o acompanhou, agüardo ancioso, como todo o publico medico com a soffreguidão com que são sempre esperados os trabalhos do nosso venerando presidente. N'estes casos singulares, como no que nos occupa, é unica a physio-pathologia do phenomeno, sendo que no ultimo a dilatação arterio-capillar nevro-paralytica é generalisada e menos duradoura, ao passo que nos primeiros é mais tenaz e limitada aos districtos regionaes em que a fixa a auto-suggestão, ordinariamente inconsciente, que é o seu factor

capital. E da mesma natureza intima, differindo apenas pela intensidade menor, participa o phenomeno que se passa nas mulheres autographicas, primeiro observadas por Dujardin-Beaumetz.

E', porém, occasião agora de inquirir qual o papel exercido pela droga ingerida pela doente immediatamente antes da explosão dos accidentes nevropathicos em discussão. Prender-se-iam elles, unicamente, pelo laço erroneo do *post hoc*?

Tanto mais se torna difficil a solução d'este novo problema, quanto é totalmente ignorada a natureza da alludida substancia.

Podem-se, não obstante, ensaiar algumas considerações mesmo no terreno instavel das conjecturas.

Não desconheço a existencia de hematidroses independentes da hysteria, porquanto ainda que se possam pôr á margem ou em duvida as observações de Huxham referentes a diversas molestias que se acompanham de alteração do sangue, não se pôde todavia negar fé ao asserto de Guyon, relativamente á febre amarella. Não seria portanto, á primeira vista desarrasoada a hypothese de que a alteração hemopathica ou pseudo hemophilica, determinada pelo agente toxico suspeito, pudesse dar a explicação do phenomeno. E teria isso naturalmente de ser açoitado, si a hematidrose se tivesse apresentado como manifestação unica e protopathica.

Os factos, porém, tiveram concatenação diversa. A nevrose asthmatica preexistente cedeo o passo ás manifestações francas e apparatusas de uma hysteria proteiforme; com estas sobreveio, tambem, a hematidrose, apparecendo, as primeiras vezes, como um epilogo dos accessos de clownismo; depois, estes, por sua vez, se fizeram substituir por ella, que se apresentava então precedida sempre de phenomenos francos de aura hysteric. Logo, existe, bem se vê, uma correlação intima, um laço inextricavel, indestructivel, entre a hematidrose e a hysteria n'este caso. E, si alguma influencia exerceo, como parece, na genese d'este quadro morbido, a droga propinada, muito mais crível se

me affigura haver sido ella a de promover o despertar da grande nevrose, que já existia larvada ou latente.

Nem faltam na pathologia da especialidade analogias que auctorisem esta opinião. E' sabido que muitas molestias em que a crase sanguinea é modificada tem o poder de provocar manifestações hystericas não suspeitadas ou reveladas anteriormente, como se vê acontecer com o impaludismo, a febre typhoide e, muito particularmente, a syphilis; e, em facto mesmo de intóxicacões, temos todo o grupo das hysterias toxicas, levantado por Charcot, as quaes tem o seo mais significativo exemplar na hysteria saturnina.

Que muito é, pois, que se admitta que a droga em questão, á maneira d'esses outros toxicos, houvesse actuado sobre os grandes centros da innervação, particularmente na esphera do sympathico, para explicar a predilecção pelas paralyrias vaso-motrizes, especialmente dos nervos vasculares das glandulas sudoriparas e a não menos excitação dos filetes secretorios ou nervos excito-sudoraes de Vulpian, com relação ás glandulas sudoriparas omphalicas, imprimindo d'est'arte á hysteria, em potencia, um vigor que a puzesse em acção? Não é para esquecer ou desprezar o facto de terem aberto a scena morbida actual stomatorrhagias e epistaxis, revelando desde logo a predominancia do effeito sobre o trisplanchnico e a innervação vaso-motriz; e, se me permittissem o espaço e o tempo, seria essa uma transição natural para chegar á apreciação da doutrina de Brown-Sequard, segundo a qual a hysteria é sempre uma nevrose do grande sympathico, dependendo as perturbações funcçionaes, na esphera da vida de relação, das ischemias e hyperhemias mais ou menos transitorias ou permanentes que se passam nas differentes regiões do eixo cerebro-espinhal. Servir-me-ia tambem o caso em questão de oportunidade e elemento para uma reflexão mais acurada sobre convicção que se me vai infiltrando no espirito, cada vez mais firme, de que muito mais da bio-chimica ou da chimica pathologica, especialmente nos dominios da hematologia, do que da anatomo-

mia pathologica se deverá esperar a luz para a elucidação definitiva do problema, pathogenico da hysteria, reconhecendo-lhe do mesmo modo que para a neurasthenia e a irritação espinhal, suas relações de filiação ou parentesco com a grande familia bradytrophica de Bouchard, e evidenciando o papel, quiçá importantissimo, que os principios resultantes de uma elaboração e assimilação anormaes dos materiaes organicos, em consequencia de um desvio morbido do typo nutritivo, ou provenientes de lecomainas e ptomainas anormalmente retidas ou formadas, exercem sobre os grandes centros da innervação encephalo-rachidiana e ganglionar, em a genese d'essa triade neuro-pathologica. Sou tambem forçado a tocar apenas de leve na ponta d'esse espesso véo, cuja opacidade me vai parecendo um tanto menor depois que o humorismo tem gradualmente avançado na conquista do terreno perdido sobre o solidismo.

Para finalizar, devo dizer que prescrevi á doente de que metenho occupado, como base do tratamento, a hydrotherapia, sob a forma de duchas frias, unica a sua disposição, a morada do campo, nas condições que mais se aproximassem do completo isolamento que seria para desejar, e o uso interno da tinctura de perchlorêto de ferro e do extracto fluido de centeio espigado, ás gottas, medicação eusthenica, excitadora da hematose e vaso-constrictora, aconselhada antes para desencargo de consciencia do que pela confiança que eu theoreticamente lhe devia depositar. Nem siquer ensaiei a medicação bromêtada, porquanto si é verdade que ainda se lê, com surpresa, em Dujardin-Baumetz, que « quem diz hysteria diz bromêto », o que só se explica pela difficuldade de inferir conclusões therapeuticas, em materia de hysteria, onde em casos identicos umas vezes tudo serve e outras nada aproveita, em virtude da singular ataxia therapeutica de que falla Huchard e do muito que se tem despresado o valor incalculavel do elemento suggestivo em certas applicações, todavia tenho por inconcusso, em face da quasi unanime e cathgorica affirmativa dos neuro-

pathologistas e clinicos eminentes que se tem dedicado ao estudo da especie, particularmente na Salpêtrière, que se ha verdadeiramente demonstrada em therapeutica é a do contraste admiravel entre os brilhantes resultados que dão os bromêtos, com especialidade os alcalinos, em o tratamento da epilepsia e a sua improficuidade absoluta na hysteria, devido a poder servir até o seu emprego de criterio para o diagnostico differencial, ás vezes difficil, entre o verdadeiro mal comicial e a hystero-epilepsia ou hysteria *major* de Charcot, hysteria epileptiforme de Louyer-Villermay ou epilepto-hysteria de Huchard, o que ainda uma vez demonstra a distincção e separação completa das duas grandes nervoses, muito embora sua fusão apparente nos pretendidos ataques-accessos da supposta hysteria de crises mixtas ou combinadas.

A franklinisação, de que, ao contrario, acredito haveria tudo a esperar, n'este caso não podia infelizmente ser empregada por não ter á minha disposição uma machina de Carré, ou outra de electricidade statica.

A quem conhece o valor da hypnotherapia ou da medicina suggestiva sobre as differentes funcções da vida organica e, o que vem mais ao caso, sobre a propria vaso-motricidade, como verificam frequentemente os que a sabem ou querem empregar na cura de multiplas e variadas perturbações gastro-intestinaes e da funcção catamenial, e diante ainda das bellas e significativas experiencias do notavel physiologista, o professor Beaunis, relativamente á annullação do effeito vesicante do papel de Albespeyres e a transferencia de sua acção para um encerado commum, por simples suggestão, deveria naturalmente occorrer e impôr-se o emprego d'esse importante methodo de tratamento.

Empreguei-o ; mas sem a regularidade precisa, porque só a grandes intervallos podia ver a doente, e sem grandes esperanças por não ignorar que esse tratamento, comquanto um dos melhores, está todavia sujeito ás mesmas decepções que todos os outros na hysteria, sendo ineluctavel, ao contrario do

que muitos erradamente supõem, que os seus mais brilhantes e estrondosos successos contam-se muitas vezes em individuos absolutamente indemnes d'essa nevrose.

No caso vertente, manda a prudencia nada concluir. Perdi a doente de vista no fim de um mez, tendo apenas feito quatro ou cinco sessões hypnoticas, e si bem que os accessos houvessem não só variado como se attenuado consideravelmente, é indispensavel, tratando-se de molestia susceptivel de retrogradar espontaneamente, não esquecer a parte do resultado que possa legitimamente caber ao tempo e á natureza *vis medicatrix*, esses dois grandes auxiliares do medico nas affecções d'este genero.

---

## ENDEMIOLOGIA

---

### **Algumas observações sobre as febres palustres nas Lavras Diamantinas do Sincorá**

FEITAS DURANTE TRES ANNOS

PELO DR. JULIO DA GAMA

(Continuação da pag. 270, do vol. 2º, serie 3.ª)

Motivos independentes de nossa vontade obrigarão-nos a não continuar, ha mais tempo, a publicação de nossas observações, o que fazemos presentemente; não nos tendo sido, porém, prejudicial a demora, por que colhemos mais alguns factos que, descriptos agora, apenas offerecem o inconveniente de discordarem da epigrapha, por terem sido observados em oito annos, e não somente em trez.

As febres palustres atacam ordinariamente o estomago, ainda que por uma leve indisposição, na maioria dos casos; mas ha alguns em que não fica somente nisto, porque além da lingua saburrosa, e da fetidez do halito, apresentam-se vomitos rebeldes á medicação, de maneira a darem verdadeiro cuidado ao