

ctura entre o corpo e o collo do utero, d'onde a atonia do segmento medio e a flexão do orgão no isthmo (*Bulletin Médical*).

ESTATISTICA DA RAIVA NO RIO DE JANEIRO.—Em uma das ultimas sessões da Academia das Sciencias de Paris foi lida uma carta do Sr. D. Pedro II (ex-imperador do Brazil) dirigida a M. Pasteur e pedindo de communicar á Academia a estatistica do tratamento preventivo da raiva, de 9 de Fevereiro de 1889 a 15 de Setembro, feito no Instituto Pasteur do Rio de Janeiro, sob a direcção do Sr. Dr. Ferreira dos Santos.

Tresentas pessoas apresentaram-se ao Instituto durante este periodo. Cento e noventa e oito não foram submettidas ás inoculações, porque na maioria dos casos os animaes que as tinham mordido não eram hydrophobos, e em outras não havia ferida, apenas despedaçamento do vestuario. Do numero das pessoas admittidas a soffrer o tratamento preventivo, cento e sessenta e duas, deve-se deduzir :

1°—5 pessoas que foram ligeiramente mordidas por animaes apenas suspeitos e que não completaram o tratamento ;

2°—1 pessoa, que tendo sido gravemente mordida no rosto foi acommettida de raiva no vigesimo terceiro dia e morta durante o tratamento, com a importante circumstancia de que, durante tal periodo o doente faltou dez vezes ás inoculações.

Tres meninos, gravemente mordidos pelo mesmo cão havia um anno, foram salvos.

O numero de pessoas que completaram o tratamento attingio a 156. Destas só houve um caso fatal, provavel mas não seguramente pela raiva, visto que o doente não fôra examinado por medico.

A mortalidade foi portanto, admittindo este unico insuccesso, de 0,64 por 100.

DIARRHÉA CHOLERIFORME DAS CRIANÇAS.—(Dr. Baginsky, de Berlim). Sabe-se que na mortalidade dos meninos as molestias do apparelho digestivo representam papel consideravel.